

Questão 1

Nome genérico da medicação.

(20 pontos)

Posologia/Via de administração.

Itens do receituário.

Nome genérico	Dose	Posologia/Via de Administração
Cloridrato de Clindamicina / Clindamicina	600 mg	4 cápsulas de 150 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento 2 cápsulas de 300 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento 3 comprimidos de 250 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento 1 e ½ compr. de 500 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento
Azitromicina dihidratada / Azitromicina	500 mg	2 cáps/compr. de 250 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento 1 cáps/compr. de 500 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento ½ compr. de 1 g, por via oral, uma hora antes do procedimento
Claritromicina	500 mg	2 compr. de 250 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento 1 compr. de 500 mg, por via oral, uma hora antes do procedimento

Questão 2

Exposição da raiz (do cimento, ou dentina radicular, ou recessão gengival).

(20 pontos)

Hiperestesia.

Aplicação de dessensibilizante (laser de baixa potência/eletrofluorese/medicamentos à base de oxalato de potássio, dipotássio difosfato, fluoreto de sódio, cloreto de cálcio ou benzoato de sódio/hidróxido de cálcio) ou sistema adesivo ou cimento de ionômero de vidro.

Bochecho com flúor e/ou pasta com dessensibilizante.

Questão 3Raspagem supragengival e subgengival e orientações sobre higiene oral e controle de placa. **(20 pontos)**

Extração dos dentes 12, 17 e 27.

Implante na região dos dentes 12 e 14 **ou**Implante na região do dente 12 e prótese parcial fixa adesiva dos dentes 13 ao 15 **ou**Implante na região do dente 12 e prótese parcial fixa dos dentes 13 ao 15 **ou**Prótese parcial fixa dos dentes 11 ao 15 **ou**Prótese parcial fixa adesiva dos dentes 11 ao 13 e implante na região do dente 14 **ou**

Prótese parcial removível dos dentes 11 ao 15.

Questão 4

Concussão ou comoção.

(20 pontos)

Alívio oclusal se necessário e tomada radiográfica.

Recomendação de alimentação líquida ou pastosa até a dor diminuir.

Necrose pulpar.

Questão 5

Distribuição dos componentes cariado, perdido e obturado demonstra a necessidade de tratamento restaurador (pai, mãe, filho e filha) e reabilitador (pai, mãe e avô).

(20 pontos)

Os profissionais devem ter responsabilidade sanitária em relação à família, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde bucal.

A educação em saúde deve contemplar orientações sobre as situações de saúde bucal e sistêmica, nas diferentes fases da vida, com ênfase aos cuidados com a qualidade de vida.

No âmbito da atenção básica, ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal devem ser planejadas e desenvolvidas de forma interdisciplinar.

As ações especializadas de saúde bucal devem ser referenciadas no próprio território municipal ou no município sede, conforme Plano Diretor de Regionalização do SUS.